

Ирригоскопия, ирригография.

За 1-2 дня до процедуры желательно перейти на щадящую диету, исключив из рациона питания черный хлеб, картофель, грибы, бобовые, существенно ограничить употребление овощей и фруктов, зелени, ягод. Рекомендуются употреблять бульоны и жидкие супы, манную кашу, яйца, отварное мясо, вареные колбасы, рыбу, сыр, масло, кисломолочные продукты (кроме творога).

Голодать накануне и в день исследования не нужно! Можно пить бульон, чай, воду без газа.

В настоящее время подготовка пациента к **ирригоскопии** проводится при помощи лекарственных препаратов изотонического раствора электролитов (Фортранс, Лавакол, Флит Фосфо-сода).

Подготовку следует проводить **строго** соблюдая схему, приведенную в инструкции к препарату!

Пример подготовки при помощи препарата **Фортранс**:

- Содержимое одного пакетика следует растворить в 1 л воды и размешать до полного растворения.
- Раствор следует принимать в дозировке, равной 1 л на 15–20 кг массы тела, что примерно соответствует 3–4 л.
- Раствор принять однократно вечером накануне исследования или операции.
- Утром перед исследованием – легкий завтрак жидкой пищей.

Подготовка пациента к ирригоскопии при помощи клизм является неэффективной!

Рентгенография желудка, пищевода, 12-перстной кишки.

Необходимо приходиться на исследование строго натощак!

Строго запрещается перед исследованием курить, принимать таблетированные препараты, чистить зубы.

Рентгеновская денситометрия.

- Специальной подготовки к исследованию не требуется. Максимальный вес пациента – 130 кг.
- При наличии эндопротезов крупных суставов – предупредить врача!
- Рекомендуются приходит на исследование в одежде не содержащей металлические элементы (железные пуговицы, молнии и т.д.).

Если у вас возникли вопросы:

+7 (499) 187-29-96

пн-вс, с 08:00 до 20:00